

Bệnh sởi - Cách nhận biết và phòng tránh bệnh

Tính từ ngày 19/8/2024 đến ngày 25/8/2024 ghi nhận 85 ca sốt phát ban nghi sởi sống tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó 20 ca dương tính (23,5%), 44 ca không lấy mẫu (51,8%), 17 ca chưa có kết quả (20,0%) và 4 ca âm tính (4,7%). Tổng số ca sốt phát ban nghi sởi tích lũy từ đầu năm đến tuần 34 là 525 ca, cụ thể có 209 ca dương tính (39,8%), 164 ca không lấy mẫu (31,2%), 02 ca có kết quả xét nghiệm không xác định (0,4%), 23 ca chưa có kết quả (4,4%) và 127 ca âm tính (24,2%).

Vì vậy quý phụ huynh có con em từ 09 đến 36 tháng tuổi chưa tiêm ngừa sởi hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi hãy đưa con em mình đến trạm y tế gần nhất để được tiêm ngừa phòng bệnh sởi!

LỊCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN SỞI CHO TRẺ

BẠN CẦN CHO TRẺ
tiêm đủ 2 mũi vắc xin SỞI
theo lịch khuyến cáo trong chương trình
tiêm chủng mở rộng:

- ☀ **Mũi 1** : Tiêm khi trẻ đủ **9** tháng tuổi
(vắc xin sởi)
- ☀ **Mũi 2** : Tiêm khi trẻ đủ **18** tháng tuổi
(vắc xin sởi - rubella)



Nếu trẻ chưa được tiêm phòng hoặc trễ lịch tiêm theo hẹn, cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng đầy đủ cho trẻ.

Bạn có thể tiêm vắc xin sởi tại:

- ☀ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố
- ☀ Trung tâm Y tế
- ☀ Trạm Y tế
- ☀ Cơ sở tiêm chủng khác



Liên hệ Trạm Y tế nơi trẻ đang cư trú để biết lịch tiêm phòng vắc xin sởi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.



SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. HCM

Tiêm đủ 2 mũi vắc xin để phòng bệnh SỞI

1. Biểu hiện bệnh: Thường gặp là:

- Sốt dai dẳng từ 39-40°C
- Phát ban theo thứ tự từ đầu xuống chân
- Dấu hiệu viêm long: Ho, sổ mũi, mắt đỏ, có thể nổi hạch (cổ, sau tai), sưng khớp.

2. Biến chứng:

- Các biến chứng bệnh nhân có thể bị viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi,... Nặng có thể gặp biến chứng viêm cơ tim, viêm não...

3. Cách phòng chống:

3.1. Tiêm vắc xin

- Tiêm vắc xin là biện pháp phòng sỏi chủ động nhất.
- Tiêm vắc xin phòng bệnh sỏi mũi đầu khi trẻ được 9 tháng, mũi 2 khi trẻ được 18 tháng. (nếu chỉ tiêm 1 mũi khả năng miễn dịch chỉ đạt 85%, tiêm đủ 2 mũi khả năng miễn dịch đạt 99%).

3.2. Vệ sinh cá nhân và môi trường

- Khi phát hiện trẻ mắc bệnh cần cách ly trẻ bệnh với trẻ lành.
- Đảm bảo tắm rửa sạch sẽ cho trẻ hàng ngày, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sát khuẩn.
- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh hay nghi ngờ bệnh sỏi.
- Vệ sinh đường mũi, mắt hàng ngày.
- Lau nhà, bàn, ghế, cầu thang đồ chơi nơi khu vực vệ sinh chung bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Mời quý phụ huynh quét mã QR dưới đây để biết thêm thông tin và cách chăm sóc khi trẻ mắc bệnh sỏi.



Trường tiểu học Phước Bình

Nguồn : HCDC